

复方氨基酸注射液中 胱氨酸含量的测定方法

本文建立了一种复方氨基酸注射液(18AA)中胱氨酸含量的测定方法——在碱性条件下,采用1,4-二硫代苏糖醇将胱氨酸还原成半胱氨酸,生成的半胱氨酸与酸性茚三酮溶液反应,生成红色产物,在560 nm波长处测定吸光度,用对照品标准曲线法测定复方氨基酸注射液(18AA)中胱氨酸的含量。测定结果显示胱氨酸浓度在0.0418~0.2088 mg/ml范围内线性关系良好($r=0.9992$);平均加样回收率为101.61%(RSD为1.96%, $n=9$)。这证明本方法准确、重现性好,可用于复方氨基酸注射液(18AA)中胱氨酸的含量测定。

文 / 乔晓芳 蒋芙蓉 刘再德 兰香南 周慧

复方氨基酸注射液在临床上应用广泛,目前在临床应用的品种主要有补充营养用氨基酸、小儿用氨基酸、肾病用氨基酸和肝病用氨基酸,适用人群包括老人、成人、儿童,主要以中心静脉插管或由外周静脉滴注,还有补充氨基酸的口服制剂在临床应用^[1-8]。复方氨基酸注射液(18AA)含必需氨基酸与非必需氨基酸,在临床主要用于蛋白质摄入不足、吸收障碍等氨基酸不能满足机体代谢需要的患者。鉴于当前质量标准中未对胱氨酸的含量进行测定^[9-11],特开展复方氨基酸注射液(18AA)中胱氨酸含量检测方法的研究,便于全面控制该品种的质量。

本文第一作者乔晓芳就职于河南省药品审评查验中心;通讯作者周慧和其他作者均就职于湖南科伦制药有限公司。

1. 试验材料

1.1 仪器

UV2450 双光束紫外-可见分光光度计,岛津公司产。电子分析天平BP211D,北京赛多利斯仪器系统有限公司产。电子天平ES-1000HA,长沙湘平科技发展有限公司产。

1.2 样品与试剂

复方氨基酸注射液,批号:C120426 C;规格:500 ml:25 g(总氨基酸);湖南科伦制药有限公司产。胱氨酸对照品,中国药品生物制品检定所提供。盐酸为分析纯。二硫代苏糖醇为分析纯。茚三酮为分析纯。试验用水为湖南科伦制药有限公司自制。其他试剂均为分析纯。

2. 方法与结果

2.1 测定方法:

标准曲线制备:称取胱氨酸对

照品适量,用少量0.1 mol/L盐酸溶解后用水稀释制成每1 ml中约含0.5 mg的溶液,分别精密量取1 ml、2 ml、3 ml、4 ml、5 ml置10 ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,分别精密量取2.5 ml稀释后溶液置10 ml量瓶中,加入酚酞指示液3滴,再加10 mol/L氢氧化钠溶液50 μ l使溶液呈红色,精密加入二硫代苏糖醇溶液(取1,4-二硫代苏糖醇40 mg,加水溶解并稀释至25 ml)2.5 ml,用水稀释至刻度,摇匀,在室温放置30 min后,精密量取1 ml置25 ml具塞试管底部,精密加入冰醋酸1 ml和酸性茚三酮溶液(取茚三酮0.5 g,加冰醋酸6 ml和盐酸4 ml使之溶解)1 ml,轻轻摇匀,密塞,在90℃水浴中准确加热10 min,立即冷却,最后精密加入乙醇15 ml,摇匀。在560 nm波长处测定吸光度,以吸光度与

表 1 胱氨酸含量测定——线性与范围

胱氨酸浓度 C (mg/ml)	吸收度 A	回归方程	相关系数 r
0.0418	0.1560	A=3.3025C+0.0256	0.9992
0.0835	0.3043		
0.1253	0.4456		
0.1670	0.5865		
0.2088	0.7043		

表 2 胱氨酸含量测定——空白回收试验

样品名称	胱氨酸测得量 (μg/ml)	胱氨酸加入量 (μg/ml)	加样回收率 (%)	平均加样回收率 (%)	RSD (%)
低浓度 1	0.0533	0.0543	98.13	101.61	1.96
低浓度 2	0.0546	0.0543	100.52		
低浓度 3	0.0553	0.0543	101.82		
中浓度 1	0.1070	0.1044	102.51		
中浓度 2	0.1084	0.1044	103.81		
中浓度 3	0.1091	0.1044	104.45		
高浓度 1	0.1252	0.1253	99.94		
高浓度 2	0.1262	0.1253	100.70		
高浓度 3	0.1285	0.1253	102.58		

其相应的浓度计算回归方程。

测定：精密量取复方氨基酸注射液 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，从上述“加入酚酞指示液 3 滴”开始，依法操作，测定吸光度，由回归方程计算胱氨酸的含量。

2.2 方法原理

在碱性条件下，采用 1，4-二巯代苏糖醇将胱氨酸还原成半胱氨酸，生成的半胱氨酸与酸性茚三酮溶液反应，生成红色产物，在 560 nm 波长处测定吸光度，用对照品标准曲线法测定注射液中胱氨酸的含量。

2.3 验证

2.3.1 专属性

空白溶液配制：按处方量称取除胱氨酸以外的各原辅料，配制

成溶液，精密量取 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。

对照品溶液配制：精密称取胱氨酸对照品 13.98 mg 置 25 ml 量瓶中，先用适量 0.1 mol/L 盐酸溶解后，再用水稀释至刻度，摇匀，

表 3 胱氨酸含量测定——重复性试验

样品名称	吸收度 A	平均吸收度	RSD (%)
重复性 1	0.2826	0.2845	1.12
重复性 2	0.2907		
重复性 3	0.2840		
重复性 4	0.2840		
重复性 5	0.2817		
重复性 6	0.2842		

精密量取 2.5 ml 稀释后溶液置 10 ml 量瓶中，按照“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。

供试品溶液配制：精密量取 C120426 C 批复方氨基酸注射液 (18AA) 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。

扫描上述样品，结果显示对照品溶液和供试品溶液在 560 nm 有最大吸收，空白溶液基本无干扰。

2.3.2 线性范围

精密称取胱氨酸对照品 (140624-200805) 20.88 mg 置 50 ml 量瓶中，先用适量 0.1 mol/L 盐酸溶解后，再用水稀释至刻度，摇匀，得对照品贮备液。分别精密量取 1 ml、2 ml、3 ml、4 ml、5 ml 对照品贮备液置于 10 ml 量瓶中，用水稀释至刻度。分别精密量取 2.5 ml 稀释后溶液置 10 ml 量瓶中，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。结果见表 1。

结果表明胱氨酸浓度在 0.0418 ~ 0.2088 mg/ml 范围内线性关系良好。样品测定浓度在 0.1 mg/ml，在此范围内。

2.3.3 空白回收试验

低浓度样品溶液配制 (55%)：精密量取线性范围项下对照品贮

表 4 胱氨酸含量测定——溶液稳定性

放置时间 (min)	吸收值 A	胱氨酸含量 (%)
0	0.3084	84.47
20	0.3072	84.14
30	0.3004	82.28
60	0.2679	73.38

表 5 胱氨酸含量测定耐用性考察

反应温度 (°C)	反应时间 (min)	胱氨酸含量 (%)
80	5	91.63
	10	100.60
	15	101.48
90	5	102.00
	10	81.49
	15	79.29
100	5	97.34
	10	88.43
	15	78.31

表 6 胱氨酸含量测定结果

样品批号	胱氨酸含量 (%)
C120426 C	81.49
C120426 D	84.42
C120426 E	82.22

备液 1.3 ml 置 10 ml 量瓶中，加水稀释至刻度摇匀，精密量取 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，加空白溶液 2.5 ml，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。平行制备 3 份样品。

中浓度样品溶液配制 (100%)：精密量取线性范围项下对照品贮备液 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，加水稀释至刻度摇匀，精密量取 2.5 ml 稀释后溶液置 10 ml 量瓶中，加空白溶液 2.5 ml，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。平行制

备 3 份样品。
高浓度样品溶液配制 (120%)：精密量取线性范围项下对照品贮备液 3 ml 置 10 ml 量瓶中，加水稀释至刻度摇匀，精密量取 2.5 ml 稀释后溶液置 10 ml 量瓶中，加空白溶液 2.5 ml，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。平行制备 3 份样品。
将上述样品测得的吸光度用线性范围项下的标准曲线计算含量，结果见表 2。
表 2 的结果表明该方法准确

度好。

2.3.4 重复性试验

精密量取复方氨基酸注射液 (18AA) 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。平行制备 6 份。测定结果见表 3。

表 3 的结果表明该方法重复性较好。

2.3.5 溶液稳定性试验

精密称取胱氨酸对照品 12.62 mg 置 25 ml 量瓶中，用少量 0.1 mol/L 盐酸溶解后，加水稀释至刻度，分别精密量取 0.5 ml、1 ml、2 ml、3 ml、4 ml 置 10 ml 量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀。精密量取 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，按照前文“2.1”项下“加入酚酞指示液 3 滴”起，同法操作。另精密量取复方氨基酸注射液 (18AA) 2.5 ml 置 10 ml 量瓶中，同法测定 (分别放置一定时间后再测定吸收值)。计算供试品中的胱氨酸含量。结果见表 4。

表 4 的结果表明本品在显色反应完成后，吸收值有下降趋势，所以应尽量在 30 min 内测定。

2.3.6 耐用性考察

按照前文“2.1”项下方法，考察本试验中反应温度、时间不同对胱氨酸含量测定的影响。结果见表 5。

从表 5 的试验结果可以看出，反应温度在 80℃ ~ 100℃、反应时间在 5 ~ 15 min 范围变化时，胱氨酸含量测定结果有一定的差异，耐用性不是很理想，但在 90℃ 准确反应 10 min 时该方法准确度、线性、重复性均好，这表明操作时需注意反应条件及反应时间。

2.3.7 样品测定

取 C120426 C、C120426 D、

C120426 E 三批复方氨基酸注射液(18AA)样品,分别按照前文“2.1”项下进行测定,反应温度为90℃,反应时间为10 min。结果见表6。

3. 讨论

在现有的复方氨基酸注射液(18AA)国家标准中均未收载胱氨酸含量的相关内容,但胱氨酸确为该产品的有效成分之一,增加胱氨酸含量检测是有必要的。以上方法的线性、准确度、重现性均比较好,虽然耐用性不理想,但通过控制反应条件、加强检验人员的考核便能够使检验结果稳定准确,不失为一种可行的测定方法。

【参考文献】

- [1] 张大磊,尚保敏.还原型谷胱甘肽与复方甘草酸苷、复方氨基酸注射液联合治疗酒精性肝硬化的效果[J].河南医学研究,2022,31(17):3181-3183.
- [2] 彭晓红,卢有亮,黎丹,等.复方氨基酸注射液联合小剂量垂体后叶素治疗重症颅脑损伤合并高钠高氯血症的临床效果[J].临床合理用药杂志,2022,15(16):79-81.
- [3] 张伊依,方菊妹,胡逸凡,等.复方氨基酸注射液(18AA)治疗胎儿宫内生长受限的不良反应观察及探讨[J].中国医药导刊,2020,22(05):315-318.
- [4] 涂建平,刘增周,吕娜珍.小儿复方氨基酸注射液治疗小儿腹泻效果观察[J].黑龙江医药,2020,33(02):320-322.
- [5] 张伊依,方菊妹,胡逸凡,等.复方氨基酸注射液(18AA)治疗胎儿宫内生长受限的不良反应观察及探讨[J].中国医药导刊,2020,22(05):315-318.
- [6] 谢福武.小儿复方氨基酸注射液治疗小儿腹泻的疗效[J].中国医药科学,2019,9(21):96-

97+177.

- [7] 郝国平,邱发宗,邹云.小儿复方氨基酸注射液治疗小儿秋季腹泻疗效观察[J].国外医药(抗生素分册),2015,36(02):73-74.
- [8] 顾燕,钟晓萍,王承芳.小儿复方氨基酸注射液与小剂量654-2联合应用治疗小儿轮状病毒感染性腹泻的临床疗效观察[J].中国医药指南,2014,12(17):270-271.w
- [9] 国家药典委员会.中华人民共和国药典2020年版二部[M].北京:中国医药科技出版社,2020.
- [10] 赵刚.比色法测定复方氨基酸注射液中胱氨酸含量[J].首都医药,2011,18(04):52-53.
- [11] 国家药品监督管理局,国家药典委员会.国家药品监督管理局国家药品标准 复方氨基酸注射液(18AA):WS1-XG-002-2011[S/OL]. [2023-02-23].<https://www.chp.org.cn/#/business/standard?keyword=%E5%A4%8D%E6%96%B9%E6%B0%A8%E5%9F%BA%E9%85%B8%E6%B3%A8%E5%B0%84%E6%B6%B2>.



PAPENMEIER
Lumiglas

一步到位

视镜·刮板·射灯 三合一解决方案

上海威勒机电设备有限公司
地址:上海市松江区九新公路877号1号楼515室
联系人:张 竞 电话:13381813522
邮箱:zhangjing@shweser.com

广告